

ANIMAL DAMAGE CONTROL

6-10-88
New 5th

L-1907S

CONTROLAR EL DAÑO HECHO POR LOS TACUACHES

Rhonda Liles*
Noemi Ethel Galvan*

Un tacuache es un mamífero aproximadamente del tamaño de un gato doméstico. Tiene una cara larga y puntiaguda, orejas redondas sin pelo, patas cortas y una cola semejante a la de una rata. Varía de color gris a blanco. Puede pesar hasta 14 libras, pero pesa normalmente de 4 a 7 libras. Es el único animal con bolsa (marsupial) en Norteamérica. La cría nace 13 días después del apareamiento, y son aproximadamente de media pulgada de largo, ciegos e indefensos. Después de nacer buscan la bolsa de la madre, se pegan a los pezones y continúan desarrollándose allí por 7 ó 8 semanas. Generalmente, el destete sucede aproximadamente a los 4 meses de edad.

La temporada de apareamiento en Texas normalmente es entre enero y julio. Generalmente, el tacuache tiene dos crías por año.

Los tacuaches viven en diversos lugares, variando desde los montes hasta campos abiertos. Se encuentran más comúnmente alrededor de arroyos u otras áreas húmedas. En las áreas urbanas buscan refugio en áticos, garajes, chimeneas, debajo de las casas, o en cualquier otro lugar que ofrezca protección. Aunque muy común en áreas urbanas, los tacuaches se ven raramente porque son nocturnos.

Los tacuaches son omnívoros o sea que comen una amplia variedad de alimentos. Su fuente primaria de alimento es la materia animal como insectos, gusanos, roedores pequeños, víboras, caracoles, pájaros y ranas, pero también comen muchas clases de frutas, bayas y vegetales. En áreas urbanas pueden comer alimentos para animales domésticos, frutas de los árboles, nueces,




Fig. 1. Las huellas del tacuache

*Especialista en controlar el daño hecho por animales silvestres, El Servicio Estatal para de Control Animales Dañosos, Corpus Christi, Texas.

*Especialista de Extensión en comunicaciones, traductora, el Sistema de la Universidad de Texas A&M.



Fig. 2. El tacuache con su cría

semillas en alimentadores para pájaros y basura en los basureros.

Aunque los tacuaches son considerados animales de piel deseable en algunas áreas, pueden llegar a ser perjudiciales cerca de las casas. Son capaces de transmitir varias enfermedades. Aunque pueden transmitir la rabia, parece que son muy resistentes a la enfermedad. Ya que hacen mucha baba, la gente puede pensar que tienen la rabia. Los tacuaches también acarrean el tifus murino, y las pulgas que los infestan pueden transmitir la enfermedad a la gente o animales domésticos. Donde los tacuaches sean comunes, los dueños de animal domésticos deben enpolvar a sus animales regularmente con polvo para combatir las pulgas.

Métodos de Control

El Control Mecánico. Los tacuaches pueden ser controlados por varios medios. En las áreas rurales se les puede disparar o atrapar con trampas o jaulas. En áreas urbanas usar una jaula es generalmente el método más efectivo y seguro. Los tacuaches no son animales precavidos y se pueden capturar fácilmente en una caja o jaula de tamaño adecuado. Una jaula con dimensiones de por lo menos 9x9x27 es adecuada. Casi cualquier tipo de alimento se puede usar como carnada para cazar los tacuaches, aunque hay menos probabilidad de atrapar un perro o gato pequeño si usa frutas como manzanas, peras o plátanos. Las jaulas son disponibles de los

representantes locales del Servicio Estatal para el Control de Animales Dañosos.

Control Ambiental. Varias cosas se pueden hacer para desanimar a los tacuaches cuando causan daño o son perjudiciales. Los basureros deben mantenerse cerrados; a los animales domésticos se les debe dar de comer en la mañana y debe hacerse una limpieza inmediatamente de lo que sobre; y las vasijas con agua se deben vaciar o alzar por la noche. Las ventanillas del ático y de la casa deben tener telas metálicas para que los tacuaches no entren y se refugien dentro o alrededor de la casa. Los alimentadores para pájaros se deben colocar arriba de postes de metal y lejos de los árboles.

Control Químico. Al presente, no hay venenos, fumigantes ni repelentes registrados para el control de tacuaches.

Restricciones. Los tacuaches son clasificados como animales de piel en Texas, pero es legal atraparlos. Bajo la ley del estado, una persona puede atrapar animales de piel en cualquier tiempo si estos causan daño; sin embargo, la venta de sus pieles sólo se puede hacer durante la temporada de animales de piel y con las licencias apropiadas.

Los dueños de casa que deseen atrapar tacuaches y situarlos de nuevo en otro lugar después de haberlos atrapado, deben comunicarse con los representantes locales de Parques y Animales Silvestres de Texas.

La información dada es solamente para propósitos educativos. La referencia al nombre comercial de productos o marcas se hace con el entendimiento que no hay intención de discriminación ni respaldo por el Programa Cooperativo para el Control de Animales Dañosos.

Los programas dirigidos por el Servicio Estatal para el Control de Animales Dañosos sirven a personas de todas las edades, sin distinción de niveles socioeconómicos, raza, color, sexo, religión, impedimento u origen nacional.